

Консультация для родителей "Зимние травмы у детей"

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предпочтение необходимо отдавать обуви с ребристой подошвой. Если у Вашего ребенка на сапогах или ботинках подошва гладкая, обратитесь в обувную мастерскую и попросите приспособить обувь к зимнему времени. В домашних условиях иногда советуют наклеивать на подошву обычный пластырь, но надолго его, конечно, не хватит. Особенно важно, чтобы обувь была удобной, не натирала.

В гололед надо быть осторожным, избегать скользких мест.

Помощь при травмах

Главное, о чём следует помнить, — не ложа заниматься самолечением и оттягивать визит к врачу до последнего.

Вывихи

Симптомы — сильная боль, отек, неподвижность, изменение формы сустава.

Что делать? Не старайтесь самостоятельно выправить вывихи, это может привести к болевому шоку у пострадавшего и дополнительным повреждениям. Нужно обеспечить неподвижность и покой поврежденного сустава: руку подвесить на бинте, шарфе, ремне, на ногу наложить шину (например, плоские доски) или прибинтовать её к другой ноге.

При вывихе бедра — положите пострадавшего на здоровый бок, не давая двигаться. Для уменьшения боли — приложите к поврежденному месту пульсацию со льдом или холодной водой, дать обезболивающее.

В случае крайней необходимости, когда нет возможности вызвать врача, — больного нужно транспортировать в больницу самостоятельно, соблюдая особую осторожность.



Растяжение связок

Симптомы – резкая боль при движении, припухлость, кровоподтеки.

Что делать? Наложите повязку (эластичный бинт), обеспечив неподвижность сустава, и обратитесь к врачу. Для уменьшения отёка можно наложить на больное место смоченную в холодной воде ткань или пузирь со льдом (но не более чем на 1-2 часа). Можно принять обезболивающее.

Перелом

Симптомы – сильная, резкая боль, усиливающаяся при движении конечностью, чувствительность даже к очень слабому прикосновению. Отёчность и опухание с изменением цвета кожи, изменением формы места перелома.

Что делать? Обеспечите полный покой поврежденной кости, наложите шину из подручных средств или прибинтовать поврежденные конечности друг к другу или к телу. Дайте пострадавшему таблетку анальгина, приложите на место травмы что-нибудь холодное. При кровотечении наложите на рану стерильную повязку. Вызвать "скорую", если это возможно – перевезти пострадавшего на попутной машине в ближайшее медицинское учреждение, соблюдая особую осторожность.

Ушибы головы

Симптомы – частичная или полная потеря сознания, тошнота и рвота, замедление пульса, изменение давления.

Что делать? Уложите пострадавшего на спину, повернув голову набок, положите на неё холод. Вызвать "скорую помощь" и не давать пострадавшему двигаться до ее приезда.

Желаем всем здоровья !

